

canil municipal de santa maria da feira



tema do mês: toxoplasmose

O que é a toxoplasmose?

É uma doença causada por um parasita (*Toxoplasma gondii*), que pode afectar praticamente qualquer animal de sangue quente, incluindo o Homem.



Qual a sua importância na gestação da mulher?

Tratando-se de uma doença transmissível pela placenta e apesar da mãe não apresentar sinais de doença graves e possa recuperar facilmente, caso a infecção ocorra durante o primeiro trimestre de gestação, pode provocar lesões graves no feto. Se ocorrer no último trimestre de gestação, o risco de lesões graves é menor e os bebés com toxoplasmose nascem normalmente com lesões oculares ou eritema ocular (rubor).

Qual a relação do gato com a toxoplasmose?

O gato é importante nesta doença porque apesar do toxoplasma poder parasitar todos os vertebrados, o gato é a única espécie conhecida que termina o ciclo do parasita, eliminando para o ambiente oocistos resistentes (ovos capazes de infectar). Todos os demais vertebrados, incluindo o Homem e o cão são denominados hospedeiros intermediários, porque após a infecção inicial armazenam o parasita nos seus tecidos (músculos ou vísceras).



O que significa uma análise positiva à toxoplasmose?

Uma análise positiva à toxoplasmose significa que o indivíduo, seja ele a mãe gestante ou o seu gato doméstico, já contactou com o toxoplasma em alguma fase da sua vida. Não se consegue precisar quando poderá ter ocorrido a infecção inicial. Após esta infecção, o parasita formou um quisto num tecido do hospedeiro, o qual por ter desenvolvido imunidade (defesas), ficará assim durante toda a vida do hospedeiro.

Deverá então o gato doméstico realizar análise para toxoplasmose?

Não! O facto deste apresentar uma análise positiva não implica um risco para a mulher gestante. Os gatos eliminam os oocistos apenas uma vez na vida, logo após a infecção inicial, mas permanecem positivos durante toda a vida.

Eliminam oocistos durante cerca de 3 semanas, período após o qual desenvolvem igualmente um quisto e só voltará a eliminá-los em situações extremamente raras (imunossupressão).

Como pode o gato caseiro contactar com o toxoplasma?

Cerca de 80% dos gatos domésticos contacta com o toxoplasma, pela predação de espécies infectadas (caça a ratos, esquilos, etc.).

Raramente as moscas, baratas, minhocas e outros hospedeiros acidentais podem funcionar enquanto veículo de contaminação de gatos isolados.

Quanto tempo permanece o gato infectante?

A infecção inicial ocorre assim por ingestão de caça ou de carne mal cozinhada, especialmente suína. A eliminação de oocistos ocorre entre 3 e 21 dias da carne contaminada.

Estes oocistos são bastante resistentes no ambiente, mas após eliminação nas fezes felinas, precisam de pelo menos 24 horas para esporular (criar uma cápsula resistente). Dados os gatos serem muito cuidadosos no respeitante à higiene do pêlo, não permite que os oocistos permaneçam o tempo suficiente para a criação dessa resistência.

Qual a forma mais fácil de contaminação humana com toxoplasma?

É mais comum a contaminação humana a partir de carne mal cozinhada, águas não tratadas, manuseamento de terra (jardinagem) ou ingestão de alimentos crus mal lavados.


E o cão? Pode também ser veículo de contágio?

Não! O cão representa um papel semelhante ao do Homem no ciclo do toxoplasma, ou seja, pode ingerir o parasita a partir da carne crua, água ou fezes de outros animais e formar um quisto que permanece toda a vida.

Somente o gato tem a capacidade de eliminar oocistos infectantes e, ainda assim, apenas uma vez em toda a sua vida, imediatamente após a ingestão do alimento contaminado.

O que significa uma análise negativa à toxoplasmose?

Uma análise negativa significa que o indivíduo nunca contactou com o toxoplasma. Sendo uma mulher gestante, significa igualmente que se deve evitar uma primeira infecção durante a gestação, minorando as probabilidades de ocorrerem deficiências no feto, causadas pela doença.



números do canil
(janeiro a novembro de 2007)

3197

animais vacinados

98

microchips colocados

39

animais adoptados

canil municipal de santa maria da feira

Quais os cuidados a ter no relacionamento com os gatos durante a gestação?

Durante a gestação, deve evitar o contacto com fezes de gatos ou utilizar luvas para diminuir o risco de infecção.

O areão deve ser limpo e lavado com água fervente numa base diária, dado o período de 24h necessário para os oocistos se tornarem infectantes para os humanos.

Deve evitar-se alimentar o gato com carnes mal cozinhadas e impedir que este cace. O contacto com gatos estranhos deve ser evitado pela mulher gestante.



Como evitar o contágio com toxoplasma?

-Utilizar luvas na jardinagem e lavar muito bem as mãos com água e sabão para diminuir drasticamente o risco de infecção;

-A água obtida do ambiente deve ser fervida antes da ingestão. Neste sentido, procure evitar pedir saladas em restaurantes;

-Controlar os hospedeiros de transporte (moscas, baratas, etc.);

-Cozinhar bem a carne (pelo menos a 70°C durante 20 minutos);

-Usar luvas na manipulação da carne, lavando em seguida as mãos com água e sabão;

- Congelar toda a carne durante, pelo menos, 3 dias.

Como evitar a toxoplasmose canina?

Os cães não eliminam oocistos, ao contrário dos gatos; formam apenas quistos à semelhança dos humanos.

A melhor forma de evitar a contaminação canina é impedir a coprofagia (ingestão de fezes), alimentando-os com carne bem cozinhada ou com ração.



Conclusão

A toxoplasmose é uma doença auto-limitada, sendo que o grande risco ocorre no primeiro contacto com o toxoplasma, durante o período de gestação.

Os gatos são a única espécie capaz de concluir o ciclo de vida do parasita, eliminando as formas infectantes que perpetuam a doença, mas fazem-no uma única vez na vida, logo após a infecção.

Existem formas de evitar o contágio pelo toxoplasma, sem que tenha de retirar o seu gato de estimação do seu ambiente normal.

Os gatos são factores de redução de stress, preponderante para uma gestação calma e bem sucedida.

animais para adopção no canil



Olá a todos!
Sou um jovem canídeo, macho, de cor cinzenta, bege e branca, extremamente meigo e estou aqui no canil municipal da feira, à sua espera!



Encontram-se para adopção no canil municipal da feira dois cachorros com 3 a 4 meses de idade, um macho e uma fêmea, ansiosos por ter uma nova casa! Será a sua?

Conheça mais animais que se encontram para adopção no canil municipal em <http://canilmunicipaldafeira.blogspot.com>

como adoptar?

1.º passo

Escolher o animal de estimação que pretendem adoptar, contactando ou visitando o canil municipal;

2.º passo

Depois de escolhido, ele será vacinado obrigatoriamente contra a Raiva Animal (4,90€);

3.º passo

Assinar um termo de responsabilidade (Para o efeito, deve vir munido do seu bilhete de identidade)

4.º passo (opcional)

Nessa altura ou mais tarde poderá colocar gratuitamente o microchip, que permitirá saber sempre a quem o animal pertence, em caso de fuga ou perda do animal.

5.º passo

Levá-lo para a sua nova casa.

canil municipal

endereço

Rua Joana Forjaz Pereira (Junto à estação de caminhos de ferro)
4520-Santa Maria da Feira

telefone

256 373 862

email

veterinario.municipal@cm-feira.pt

web

canilmunicipaldafeira.blogspot.com

horário de funcionamento

dias úteis (9.00h-12.00h e 13.00h-16.00h)

horário (vacinação e microchip)

terças e quintas-feiras (9.00h-12.00h)

tabela de taxas 2007

(preço por animal)

vacinação anti-rábica (4,40 €)

boletim de vacinas (0,50€)

microchip (12,60€)

